

# ROYAL SPORT

Miscuglio verde scuro con tessitura fogliare fine, ideale per superfici sportive o aree ricreative in pieno sole in climi caldi mediterranei e/o continentali di pianura. Sconsigliato in condizioni di ombra intensa. Tappeto erboso costituito da cultivar di origine americana selezionate per l'elevata resistenza al caldo, al calpestio e alle malattie. A piena maturità, si presenta molto denso e uniforme. Tollerante nei confronti del Mal Bianco, del Filo Rosso, del Dollar Spot, del Gray Leaf Spot e del Microdochium nivale.

## Composizione:

% in peso	Specie & Cultivar
35%	Loietto perenne Allstarter/Benchmark
30%	Loietto perenne Thrive
35%	Poa pratense Award



Sacco da 10 Kg

## Consigli Tecnici

<b>Terreno</b>	sciolto, drenante e profondo
<b>Periodo di semina</b>	da Febbraio fino ad inizio Novembre (saltando i mesi di massimo caldo estivo). Il miscuglio impiega da 4 a 10 gg a germinare in considerazione della temperatura dei terreni (temperatura del suolo superiore ai 10°C)
<b>Dosaggio Consigliato</b>	25-30 gr/mq. Le dosi massime sono consigliate in caso di semine tardive e/o non perfetta lavorazione del letto di semina
<b>Taglio</b>	eseguire il primo taglio quando l'erba raggiunge gli 8-10 cm. In manutenzione tenere poi 25 mm in aree sportive. Per sfalci più bassi, fare riferimento solo al taglio elicoidale. In caso d'impiego di macchine rotative, portare la rasatura a 35 mm. Royal Sport è adatto per il taglio mulch e con robot. Non asportare mai oltre il 30% della vegetazione presente. Se possibile mantenere la frequenza di taglio a 2 volte la settimana
<b>Nutrizione</b>	concimazione fosfatica alla semina per poi pianificare 4-6 concimazioni annue con almeno 30 unità di Azoto mq/annui per salire a 40 unità di Azoto mq/annui in caso di verde sportivo ad alta gestione. Durante l'anno controllare gli apporti a base di Fosforo per evitare la proliferazione della Poa annua
<b>Irrigazione</b>	all'impianto mantenere il letto di semina costantemente umido per non arrestare il processo di germinazione. Nel periodo estivo irrigare con 10 mm d'acqua ogni 2 gg. Se possibile, programmare nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto un'irrigazione termica da 1-2 mm ogni giorno intorno alle 11:00 (syringing)
<b>Fitostimolazione</b>	programmare 4 trattamenti biostimolanti tra Luglio e Agosto per aumentare la tolleranza agli stress idrici ed evitare la riduzione dell'apparato radicale
<b>Rigenerazione</b>	usare Royal Blend per le rigenerazioni nei periodi di fine campionato e/o di fine Agosto. Eseguire un leggero verticut con asporto del feltro con successiva distribuzione di circa 30-40 gr/mq attraverso l'impiego di specifiche traseminatrici da tappeto erboso

## Epoca di semina

